INIBIÇÃO DE ELASTASE POR EXTRATOS DE *CORDIA SUPERBA*: UM ESTUDO IN VITRO

ARTIGO ORIGINAL

BARBOSA, Karen Eduarda¹, SANTOS, Jorge Alexandre Nogueira ²

BARBOSA, Karen Eduarda. SANTOS, Jorge Alexandre Nogueira. **Inibição de elastase por extratos de cordia superba: um estudo in vitro**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 06, Vol. 12, pp. 40-47. Junho de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba

RESUMO

As proteases desempenham papéis fisiológicos em seres humanos e quando tem sua atividade desregulada podem gerar diversos problemas e enfermidades. A atividade proteolítica aumentada da elastase, uma serino protease produzida pelo pâncreas e neutrófilos, está relacionada com algumas com envelhecimento precoce da pele e algumas enfermidades como enfisema pulmonar e fibrose cística. Tendo em vista que plantas produzem diferentes classes de compostos bioativos, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito inibitório de extratos brutos aquosos e etanólicos da planta *Cordia Superba* sobre a atividade enzimática da elastase. Ambos os extratos apresentaram relevante inibição sobre a atividade proteolítica da elastase. O extrato aquoso apresentou porcentagem de inibição máxima de 99% na concentração de 440

¹ Graduanda de Licenciatura em Ciências Biológicas.

² Graduação em Química pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal de São Paulo e pós- doutorado em Bioquímica, com ênfase em Enzimologia.

$\mu\text{g/ml}$ e IC_{50} de $77,3 \pm 16,4 \mu\text{g/ml}$. O extrato etanólico inibiu com uma porcentagem máxima de 73% na concentração de $308 \mu\text{g/ml}$, com IC_{50} de $154,1 \pm 26,5 \mu\text{g/ml}$. Em conclusão, os resultados sugerem que os extratos brutos de *Cordia Superba* podem ser uma boa fonte para prospecção de inibidores da elastase.

Palavras-chave: Enzimas, elastase, inibição

INTRODUÇÃO

As proteases, proteinases ou peptidases compreendem um grupo de enzimas hidrolases responsáveis pela catálise das reações de hidrólise das ligações peptídicas presentes em proteínas ou peptídeos, por meio de modificações seletivas (WHITAKER, 1994; LOPEZ- OTÍN, 2002; GURUMALLESH et al., 2019).

Por meio do processamento proteolítico, essas enzimas irão permitir um grande número de processos fisiológicos entre os quais destacam: digestão proteica, reprodução, coagulação sanguínea, sistema Kallikrein-Kinin e fibrinólise (OTÍN e BONDE, 2008). Também são capazes garantir a execução de uma série de funções celulares por meio das reações em cascata dentre as quais destacam-se a homeostase e a inflamação (RAO et al., 1998). No entanto, se não controladas, podem gerar uma série de patologias em humanos, desencadeando enfermidades como enfisema pulmonar, trombose, diabetes, artrite e câncer (RAWLINGS et al., 2004; DI PAOLO et al., 2019).

As proteases apresentam são classificadas de acordo com suas funções, e quanto ao mecanismo catalítico podem ser classificadas em sete classes: aspartil-, cisteíno-, glutamil-, metalo-, serino- e treonino e atualmente as asparagino peptídeo liase- proteases (RAWLINGS et al., 2011; CAVAILLON e SINGER, 2018). Dentro das serinoproteases, encontra-se a elastase, enzima produzida pelo pâncreas e pelos neutrófilos, com alto potencial na degradação de uma variedade de proteínas da matriz extracelular, entre as quais destacam-se a fibronectina, colágeno, elastina,

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>

lamininas e proteoglicanos, bem como proteínas do plasma (BIETH, 1986; SIEDLE et al., 2003).

Essa enzima tem sua atividade regulada por uma inibidores proteicos endógenos, dentre elas a glicoproteína denominada α -1-antitripsina (AAT) codificada no gene SERPINA1, locus Pi, localizado no braço longo do cromossomo 14. Em situação normal, ocorre a ligação da enzima com seu principal inibidor ocorrendo a destruição e posterior inibição de ambas as moléculas (HUNTINGTON et al., 2000). Sem a presença do seu inibidor natural, decorrentes de fatores como mutação, por exemplo, a elastase em abundância gera lesões teciduais, já que é liberada pelos neutrófilos em processos inflamatórios (GADEK, 1990; JOHANSSON, 2002).

Uma vez que a elastase é a principal responsável pela degradação da elastina e do colágeno da matriz; e essas proteínas mediam a integridade estrutural e elasticidade da pele, ressalta-se que as depleções exacerbadas de colágeno e elastina contribuem para rugas indesejáveis e envelhecimento precoce. Em fumantes, observa-se o incremento da ação proteolítica da elastase sobre a elastina, decorrente do aumento do número de neutrófilos no pulmão (BARNES, 2003). Por essa razão, a pele torna-se mais espessa e fragmentada, gerando também um quadro de envelhecimento precoce (SUEHARA et al., 2006). Além disso, se não controlada no pulmão, a elastase ainda é capaz de gerar um quadro de enfisema, asma, lesão pulmonar aguda ou fibrose cística (ABBOUD e VIMALATHAN, 2008).

A prospecção de moléculas bioativas a partir de produtos naturais encontram em plantas uma fonte promissora de prospecção, uma vez que as espécies vegetais se caracterizam por fácil obtenção e baixo custo (OLIVEIRA et al., 2008). Uma vez que as plantas coevoluíram com microrganismos, insetos, nematóides, aves e mamíferos, foram capazes de desenvolver mecanismos de defesa para se protegerem de ataques de herbívoros e patógenos (HICKS, 1997; TREMACOLDI, 2009). Dessa forma, as plantas são capazes de desencadear uma série de

mecanismos bioquímicos que auxiliam na sua sobrevivência, entre os quais se destacam a produção de inibidores de proteases (PILON, 2016).

A espécie *Cordia Superba*, conhecida popularmente como babosa branca, pertence à ordem Boraginales e à família Boraginaceae. Estudos apontam que as espécies de *Cordia* são utilizadas na medicina popular em todo o mundo. No nordeste do Brasil essas plantas são utilizadas para tratar sintomas de reumatismo, menstruação dolorosa e dispepsia (DA SILVA et al., 2004; COSTA et al., 2008). Nesse sentido é que se evidencia o objetivo deste trabalho que foi avaliar os efeitos de extratos aquosos e etanólicos brutos dos frutos de *Cordia Superba* sobre a atividade proteolítica da enzima elastase.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os extratos foram preparados a partir da polpa dos frutos de *Cordia superba*, que foram coletados na fazenda escola do IFSULDEMINAS, pertencente ao município de Inconfidentes, Minas Gerais.

A polpa foi coletada, seca em estufa, sendo que 5 g desta foram misturados com 50 ml de água destilada, e colocada em repouso por 12 horas. O material obtido foi filtrado em papel Whatman nº 1 para a obtenção de um líquido transparente. Depois, também se preparou o extrato etanólico, pelo mesmo procedimento, no entanto, usou-se etanol 95%.

Para os ensaios de inibição, elastase do pâncreas de porco (E.C 3.4.21.36, ≥ 4 U/mg) na concentração de 1 μ g/ml foi incubada com diferentes concentrações dos extratos aquoso e etanólico por 30 minutos em tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 8, à temperatura ambiente. Após esse tempo de incubação, o substrato Succinil-ala-ala-ala-p-nitroanilida na concentração 5mM foi adicionado ao meio reacional. Depois de 5 minutos a reação foi paralisada pela adição de ácido acético 30% e a concentração de p-nitrofenol livre foi determinada medindo absorbância do meio reacional a 410 nm através de um espectrofotômetro utilizando-se cubetas de plástico com caminho

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>

óptico de 10 mm e volume de 1 ml (OKADA et al., 1981; KAPADIA e THOMSON, 1979). A porcentagem de inibição foi calculada através da equação:

$$\% \text{ inibição} = |Abs \text{ controle} - Abs \text{ extrato}| / Abs \text{ controle} \times 100\%$$

O parâmetro de inibição IC₅₀ foi calculado pela regressão não linear do plote % de inibição versus concentração de extratos utilizando-se o software Grafit 5.0 (LEATHERBARROW, 1992). Todas as medidas foram realizadas em triplicata. Os dados foram apresentados em termos de média ± desvio padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os extratos de *Cordia Superba* utilizados neste trabalho foram capazes de inibir a atividade enzimática da elastase, como mostrado no gráfico abaixo. Para o extrato aquoso, observou-se inibição de 97 % na concentração de 440 µg/ml (figura 1), com IC₅₀ de 77,3 ± 16,4 µg/ml.

Figura 1. % de inibição da elastase por extrato aquoso de *Cordia Superba*. Barras de erros são expressos como desvio padrão, n=3.

Já para o extrato alcóolico, o potencial de inibição foi um pouco maior. Verificou-se a inibição de 73% na concentração de 308 µg/ml (figura 2), com IC_{50} de $154,1 \pm 26,5$ µg/ml.

Figura 2. % de inibição da elastase por extrato etanólico de *Cordia Superba*. Barras de erros são expressos como desvio padrão, $n=3$.

Fonte: autor.

Há registros de que as espécies do gênero *Cordia* são capazes de produzir metabólitos secundários com atividade analgésica, antiinflamatória, antiartrítica e larvícida (COSTA, 2018). Entre os metabólitos produzidos, destaca-se a classe dos terpenóides, flavonóides e taninos, bem como suas respectivas substâncias químicas e estruturas que podem estar envolvidos no processo de inibição da elastase (GILBERT e FORETTO, 2012; FERREIRA et al., 2015).

CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho mostraram que os extratos brutos aquosos e etanólicos de *Cordia superba* apresentaram inibição relevante sobre a atividade enzimática da elastase. A espécie pode ser uma fonte de uma ou mais moléculas que inibem a ação da enzima. Para estudos mais detalhados, é necessário purificar e isolar esses possíveis inibidores, por meio de um fracionamento cromatográfico bio guiado desses extratos.

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>

REFERÊNCIAS

ABBOUD, R.T.; VIMALANATHAN S. Pathogenesis of COPD. Part I: The role of protease-antiprotease imbalance in emphysema. *International Journal of Tuberculosis and Lung Diseases*. v.12, n.4, p.361–367, 2008.

BARNES, P. J. New concepts in chronic obstructive pulmonary disease. **Annual review of medicine**, v. 54, n. 1, p. 113-129, 2003.

BIETH, J. G. **Elastases: catalytic and biological properties**. Academic Press, Orlando (FL), 1986. Pag.219

COSTA, J. F. O.; DAVID, J. P. L.; DAVID, J. M.; GIULIETTI, A. M.; QUEIROZ, L. P.; SANTOS, R. R.; SOARES, M. B. P. Immunomodulatory activity of extracts from *Cordia superba* Cham. and *Cordia rufescens* A. DC. (Boraginaceae), plant species native from Brazilian Semi-arid. *Revista Brasileira de Farmacognosia*. v. 18, p. 11- 15, 2008.

DI PAOLO, C. T.; FILIPPOU, P. S.; YU, Y.; PODA, G.; DIAMANDIS, E. P.; PRASSAS, I. Screening of chemical libraries in pursuit of kallikrein-5 specific inhibitors for the treatment of inflammatory dermatoses. **Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)**, v. 57, n. 11, p. 1737-1743, 2019.

CAVAILLON, J. M; SINGER, M. (Ed.). **Inflammation, 4 volume set: From molecular and cellular mechanisms to the clinic**. John Wiley & Sons, 2018.

DA SILVA, S. A. S.; SOUTO, A. L.; DE FÁTIMA AGRA, M.; DA-CUNHA, E. V. L.; BARBOSA-FILHO, J. M.; DA SILVA, M. S.; BRAZ-FILHO, R. A new aryl naphthalene type lignan from *Cordia rufescens* A. DC.(Boraginaceae). **Arkivoc**, v. 6, p. 54-58, 2004.

GADEK, J. E.; PACHT, E. R. The protease-antiprotease balance within the human lung: implications for the pathogenesis of emphysema. **Lung**, v. 168, n. 1, p. 552-564, 1990.

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>

GILBERT, B.; FAVORETO, R. *Cordia verbenacea* DC Boraginaceae. *Revista Fitos*, v.7, n.1., p.17-25, 2012.

GURUMALLESH , P.; ALAGU, K.; RAMAKRISHNAN, B.; MUTHUSAMY, S. A systematic reconsideration on proteases. **International journal of biological macromolecules**, v. 128, p. 254-267, 2019.

HICKS, D.; DUNCAN, M. J; JONGSMA, M. A.; BOLTER, C. The adaptation of insects to plant protease inhibitors. *Journal of Insect Physiology*, v. 43, n. 10, p. 885-895, 1997.

HUNTINGTON, J. A.; READ, R. J.; CARRELL, R. W. Structure of a serpin–protease complex shows inhibition by deformation. **Nature**, v. 407, n. 6806, p. 923-926, 2000.

LEATHERBARROW, R.J., GraFit Version 5.0., Erithacus Software Ltd, Staines, U.K. 1992.

MATIAS, E. F. F.; ALVES, E. F., DO NASCIMENTO SILVA, M. K., DE ALENCAR CARVALHO, V. R., COUTINHO, H. D. M., DA COSTA, J. G. M. The genus *Cordia*: botanists, ethno, chemical and pharmacological aspects. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 25, n. 5, p. 542-552, 2015.

OKADA, Y., MATSUDA, Y., NAGAMATSU, Y. E OKAMOTO, U., Synthesis of substrates specific for human spleen fibrinolytic proteinase. *Int. J. Peptide Protein Res.*, 1981, vol. 17, p. 560-564.

OLIVEIRA, R. B. D., NASCIMENTO, M. V. M., VALADARES, M. C., PAULA, J. R. D., COSTA, E. A., CUNHA, L. C. D. Avaliação dos efeitos depressores centrais do extrato etanólico das folhas de *Synadenium umbellatum* Pax. e de suas frações em camundongos albinos. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 44, n. 3, p. 485-491, 2008.

OTÍN, C. L; BOND, J. S. Proteases: Multifunctional Enzymes in Life and Disease. **Journal of Biological chemistry**, v.283, 30433-30437, 2008.

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>

PILON, A.M; VISÔTTO, L. E.; SILVA, C. R.; DE ALMEIDA BARROS, R., DE ALMEIDA OLIVEIRA, M. G. Resposta bioquímica e comportamental de *Anticarsia gemmatalis* ao inibidor de serino protease benzamidina. **Caderno de Ciências Agrárias**, v. 8, n. 1, p. 82-89, 2016.

RAO, M. B.; TRANKSALE, A. M.; GHATGE, M. S.; DESHPANDE, V. V. Molecular and biotechnological aspects of microbial proteases. **Microbiology and molecular biology reviews**, v. 62, n. 3, p. 597-635, 1998.

RAWLINGS, N. D.; BARRETT, A. J.; BATEMAN, A. Asparagine Peptide Lyases A seventh catalytic type of proteolytic enzymes. **Journal of Biological Chemistry**, v. 286, n. 44, p. 38321-38328, 2011.

RAWLINGS, N. D.; TOLLE, D. P.; BARRETT, A. J. Evolutionary families of peptidase inhibitors. **Biochemical Journal**, v. 378, n. 3, p. 705-716, 2004.

SIEDLE, B.; GUSTAVSSON, L.; JOHANSSON, S.; MURILLO, R.; CASTRO, V.; BOHLIN, L.; MERFORT, I. The effect of sesquiterpene lactones on the release of human neutrophil elastase. **Biochemical pharmacology**, v. 65, n. 5, p. 897-903, 2003.

SUEHARA, L. Y.; SIMONE, K.; MAIA, M. Evaluation of facial aging related to cigarette smoking. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 81, n. 1, p. 34-39, 2006.

THOMSON, A.; KAPADIA, S.K. The specificity of the S1 and S2 subsites of elastase, *Eur.J.Biochem*, vol.102, p. 311-116, 1979.

TREMACOLDI, C. R. Proteases e inibidores de proteases na defesa de plantas contra pragas. **Embrapa Amazônia Oriental-Documentos (INFOTECA-E)**, 2009.

WHITAKER, J. R.; STAUFFER, C. E. Principles of Enzymology for the Food Sciences (2nd edn). **Trends in Food Science and Technology**, v. 5, n. 9, p. 304-304, 1994.

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL

**NÚCLEO DO
CONHECIMENTO**

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO
CONHECIMENTO ISSN: 2448-0959

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br>

Enviado: Março, 2021.

Aprovado: Junho, 2021.

RC: 89088

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/cordia-superba>